

ICD	Diagnose	Physiother.	Ergotherapie	Logopädie	Hinweis
<b>B94.1</b>	Folgezustände der <b>Virusenzephalitis</b>	ZN1 / ZN2 / SO3	EN1 / EN2	SC1 / ST1 / SP1 / SP3 / SP4 / SP5 / RE1 / RE2 / SF	max. 1 Jahr
<b>C70.9</b> <b>C71.9</b> <b>C72.9</b>	Bösartige Neubildungen der Meningen nnb Bösartige Neubildungen des Gehirns nnb <b>Bösartige Neubildungen des ZNS</b> nnb	ZN1 / ZN2 / SO1 / SO3	EN1 / EN2 / EN3	SC1/ST1/SP1/SP2/SP3/SP5/SP6/RE1/RE2/SF	max. 1 Jahr
<b>G10</b>	<b>Chorea</b> Huntington	ZN1 / ZN2	EN1 / EN2	SC1 / SP5 / SP6	
<b>G11.9</b>	Hereditäre <b>Ataxie</b> nnb	ZN1 / ZN2	EN1 / EN2	SC1	
<b>G20.1-</b> <b>G21.8</b>	Morbus <b>Parkinson</b> (mäßig/schwer, Stadien 3/4) Sekundäres Parkinson-Syndrom	ZN2	EN2	SC1 / SP6	
<b>G35.9</b> <b>G36.9</b> <b>G37.9</b>	<b>Multiple Sklerose</b> nnb Akute disseminierte Demyelinisation nnb Demyelinisierende Krankheit des ZNS nnb	ZN1 / ZN2	EN1 / EN2 / EN3	SC1 / ST1 / SP5 / SP6	
<b>G70.0</b>	<b>Myasthenia gravis</b>	ZN1 / ZN2	EN1 / EN2 / SB7	SC1 / SP6	
<b>G81.0</b> <b>G81.1</b>	<b>Hemiparese</b> und Hemiplegie schlaff Hemiparese und Hemiplegie spastisch	ZN1/ ZN2	EN1 / EN2		
<b>I60.9</b> <b>I61.9</b> <b>I63.9</b> <b>I64.</b> <b>I69.4</b>	Subarachnoidalblutung nnb Intrazerebrale Blutung nnb Hirninfrakt nnb <b>Schlaganfall</b> nnb Folgen eines Schlaganfalls	ZN1 / ZN2	EN1 / EN2	SC1 / SP5 / SP6 / ST1	max. 1 Jahr
<b>M47.9-</b> <b>M47.9-</b> <b>M48.0-</b> <b>M50.0</b> <b>M50.1</b> <b>M51.0</b>	+ <b>G99.2</b> Spondylose mit Myelopathie + <b>G55.2</b> Spondylose mit Radikulopathie + <b>G55.3</b> Spinalstenose mit Radikulopathie + <b>G99.2</b> BS-Schaden HWS mit Myelopathie + <b>G55.1</b> BS-Schaden HWS mit Radikulopathie + <b>G99.2</b> BS-Schaden B/LWS mit Myelopathie	WS2 / EX3 / ZN1 / ZN2	EN3		max. 6 Monate
<b>Z89.-</b> <b>Z96.60</b> <b>M24.41</b>	+ <b>Z98.8</b> <b>Amputation</b> / Extremitätenverlust + <b>Z98.8</b> <b>Schulter-TEP</b> + <b>Z98.8</b> <b>Schulterluxation</b> habituell	EX2 / EX3	SB3		maximal 6 Monate post-OP
<b>Z96.64</b> <b>Z96.65</b> <b>M23.5</b>	+ <b>Z98.8</b> <b>Hüft-TEP</b> + <b>Z98.8</b> <b>Knie-TEP</b> + <b>Z98.8</b> <b>Kniegelenkinstabilität</b>	EX2 / EX3 LY2	SB2		
<b>M75.1</b>	Läsionen der <b>Rotatorenmanschette</b>	EX2 / EX3			
<b>S14.6</b> <b>S24.6</b>	Verletzungen von Nerven/Rückenmark HWS Verletzungen von Nerven/Rückenmark BWS	ZN1 / ZN2 / AT2	EN1 / EN2 / EN3		max. 1 Jahr
<b>S34.6</b>	Verletzungen von Nerven/Rückenmark LWS	ZN1 / ZN2	EN1 / EN2 / EN3		max. 1 Jahr
<b>T09.3</b>	Verletzung des Rückenmarkes, Höhe nnb	ZN1/ZN2/AT2	EN3		max. 1 Jahr
<b>M05.3-</b> <b>M05.9-</b>	Seropositive chronische Polyarthritis mit Organbeteiligung, seropositive cP nnb	WS2 / EX2 / EX3 / AT2	SB1 / SB5		
<b>M06.0-</b> <b>M06.1</b> <b>M07.3-</b> <b>M07.4-</b> <b>M07.5-</b> <b>M07.6-</b> <b>M08.9-</b>	Seronegative chronische <b>Polyarthritis</b> Adulte Form der Still-Krankheit <b>Psoriasis-Arthritis</b> <b>Crohn-Arthritis</b> <b>Colitis-ulcerosa-Arthritis</b> Arthritiden bei gastrointestinalen Krankheiten Juvenile Arthritis nnb	WS2 / EX2 / EX3	SB1 / SB5		
<b>M34.9</b>	Systemische <b>Sklerose</b> nnb	WS2 / EX2/ EX3 / AT2	SB1 / SB5		
<b>M30.0</b> <b>M31.3</b>	<b>Panarteriitis nodosa</b> Morbus <b>Wegener</b> (Granulomatose)	EX3 / ZN1 ZN2 / PN	EN1 / EN2 SB5 / SB7	SC1	
<b>M40.0-</b> <b>M41.0-</b>	<b>Kyphose</b> als Haltungsstörung Sonstige sekundäre Kyphose	WS2			>60° b. Erw.
<b>M41.2-</b> <b>M41.5-</b>	Sonstige idiopathische <b>Skoliose</b> Sonstige sekundäre Skoliose	WS2 AT2	SB1		>50° b. Erw.

Bei Angabe dieser ICD-Kodes sind Heilmittelverordnungen der genannten Indikationsschlüssel im Fall von Wirtschaftlichkeitsprüfungen von den Prüfgremien regressmindernd zu berücksichtigen. Ungeachtet kassenspezifischer Sonderregelungen empfiehlt sich regelhaft ein Antrag auf Langfristgenehmigung, da die entsprechende Liste nicht abschließend ist. Ein [Genehmigungsverzicht](#) gilt als erteilte Genehmigung.

ICD	Diagnose	Physiother.	Ergotherapie	Logopädie	Hinweis
<b>M42.04</b> <b>M42.05</b>	<b>Juvenile Osteochondrose</b> (Thorakalbereich) Juvenile Osteochondrose (Thorakolumbalbereich)	WS2			Kyphose >40° (Kind)
<b>M89.0-</b>	Morbus <b>Sudeck</b> (Neurodystrophie / Algodystrophie)	EX2 / EX3 / LY2 / PN	SB2 / SB6		max. 1 Jahr
<b>Q66.0</b>	<b>Klumpfuß</b> (Pes equinovarus) angeboren	EX4	SB3		
<b>Q68.0</b>	<b>Schiefhals</b> (Deform. M. sternocleidom.) angeboren	EX4	SB7		
<b>P27.1</b> <b>P27.8</b>	Bronchopulmonale <b>Dysplasie</b> , Ursprung perinatal Sonst. chron. <b>Atemwegskrankheit, Urspg. perinatal</b>	AT2			
<b>F80.1</b> <b>F80.2-</b>	Expressive <b>Sprachstörung</b> Rezeptive Sprachstörung			SP1/ SP2	bis 12. Lj.
<b>F83</b>	Kombinierte umschriebene <b>Entwicklungsstörungen</b>	ZN1	EN1	SP1/SP2/SP3/ SP6/RE2	bis 18. Lj.

**Besonderer geriatrischer Versorgungsbedarf ab dem 70. Lebensjahr**

ICD	Diagnose	Physiother.	Ergotherapie	Logopädie	Hinweis
<b>F00.0</b>	Demenz bei <b>Alzheimer, früher Beginn</b> (< 70)		PS5		
<b>F00.1</b> <b>F00.2</b> <b>F01.0</b> <b>F01.1</b> <b>F01.2</b> <b>F01.3</b> <b>F01.8</b> <b>F02.3</b> <b>F02.8</b> <b>F03</b>	Demenz bei Alzheimer, später Beginn Demenz bei Alzheimer, atypisch/gemischt Vaskuläre Demenz mit akutem Beginn Multiinfarkt-Demenz Subkortikale vaskuläre <b>Demenz</b> Gemischt kortikale/subkortikale vaskuläre Demenz Sonstige vaskuläre Demenz Demenz bei primärem Parkinson-Syndrom Demenz bei anderen Krankheiten Nicht näher bezeichnete Demenz		PS5		
<b>F41.0</b> <b>F41.1</b> <b>F41.2</b> <b>F41.3</b> <b>F41.8</b> <b>F41.9</b>	Panikstörung [episodisch paroxysmale Angst] Generalisierte Angststörung <b>Angst</b> und depressive Störung, gemischt Andere gemischte Angststörungen Sonstige spezifische Angststörungen Angststörung, nicht näher bezeichnet		PS2		
<b>F45.40</b> <b>F45.41</b> <b>G54.6</b> <b>R52.1</b> <b>R52.2</b>	Somatoforme <b>Schmerzstörung</b> Chronische Schmerzstörung somatisch/psychisch Phantomschmerz Chronischer unbeeinflussbarer Schmerz Sonstiger chronischer Schmerz	CS	PS2		
<b>H81.-</b> <b>H82</b> <b>R42</b>	Störungen der Vestibularfunktion <b>Schwindel</b> bei anderen Krankheiten Schwindel nnb	WS2 / EX2 / SO3			
<b>N39.3</b> <b>N39.4-</b> <b>R32</b>	Belastungsinkontinenz [Stressinkontinenz] Sonstige näher bezeichnete <b>Harninkontinenz</b> Nicht näher bezeichnete Harninkontinenz	SO2			
<b>R15</b>	<b>Stuhlinkontinenz</b>	SO2			
<b>R13.-</b> <b>E41</b> <b>R64</b>	<b>Dysphagie</b> Alimentärer Marasmus, durch Schluckstörung <b>Kachexie</b>			SC1	
<b>R26.0</b> <b>R26.1</b> <b>R26.2</b> <b>R29.6</b>	Ataktischer Gang Paretischer Gang <b>Gangstörung</b> <b>Sturzneigung</b>	WS2 / EX2 / SO3			
<b>M80.0-</b> <b>M80.2-</b> <b>M80.3-</b> <b>M80.5-</b> <b>M80.8-</b>	Postmenopausale Osteoporose mit path. Fraktur Inaktivitätsosteoporose mit path. Fraktur <b>Osteoporose</b> mit path. Fraktur (Malabsorpt. n. OP) Idiopath. Osteoporose mit pathologischer Fraktur Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur	WS1 / WS2 / EX1 / EX2 / EX3			<b>maximal 6 Monate</b>

Bei Angabe dieser ICD-Kodes sind Heilmittelverordnungen der genannten Indikationsschlüssel im Fall von Wirtschaftlichkeitsprüfungen von den Prüfungsgremien regressmindernd zu berücksichtigen. Ungeachtet kassenspezifischer Sonderregelungen empfiehlt sich regelhaft ein Antrag auf Langfristgenehmigung, da die entsprechende Liste nicht abschließend ist. Ein [Genehmigungsverzicht](#) gilt als erteilte Genehmigung.